



Impfplan



Schweizerischer Impfplan

Alter	Impfungen	Bemerkungen
► 2/4 Monate	Diphtherie / Starrkrampf / Keuchhusten / Hepatitis B Kinderlähmung (Polio) / Haemophilus influenzae Typ b Pneumokokken	1. und 2. Dosis
► 9 Monate	Masern / Mumps / Röteln	1. Dosis
► 12 Monate	Diphtherie / Starrkrampf / Keuchhusten / Hepatitis B Kinderlähmung (Polio) / Haemophilus influenzae Typ b Masern / Mumps / Röteln Pneumokokken	3. Dosis 2. Dosis
► 24 Monate	Meningokokken ACWY (Hirnhautentzündung)*	1 Dosis
► 4–7 Jahre	Diphtherie / Starrkrampf / Keuchhusten Kinderlähmung (Polio) Masern / Mumps / Röteln	1. Auffrischimpfung Nachholimpfung für Nichtgeimpfte
► 11–15 Jahre	Diphtherie / Starrkrampf / Keuchhusten Hepatitis B (Gelbsucht) Humane Papillomaviren (HPV) Meningokokken ACWY (Hirnhautentzündung)* Varizellen (Windpocken) Masern / Mumps / Röteln	2. Auffrischimpfung (ggf. Kinderlähmung) 2 Dosen für Nichtgeimpfte 2 Dosen (11–14 Jahre) oder 3 Dosen (15–26 Jahre) 1 Dosis Impfung nur, falls Krankheit nie durchgemacht Nachholimpfung für Nichtgeimpfte
► Erwachsene	Diphtherie / Starrkrampf Keuchhusten Masern / Mumps / Röteln Hepatitis B (Gelbsucht)	Auffrischimpfung mit 25 Jahren, mit 45 Jahren, mit 65 Jahren, dann alle 10 Jahre. Auffrischimpfung mit 25 Jahren, in jeder Schwangerschaft und bei Kontaktpersonen zu Säuglingen Nachholimpfung für Nichtgeimpfte Nachholimpfung für Nichtgeimpfte

Stand 2022. Empfohlen von der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, dem Bundesamt für Gesundheit, den Schweizerischen Gesellschaften für Pädiatrie, Allgemeinmedizin und Prävention und Public Health.

*Für ergänzende oder nicht aufgeführte Impfungen nehmen Sie bitte mit Ihrer ärztlichen Fachperson Kontakt auf.